

第38回キヤンサーボード開催のお知らせ

日時:平成21年9月15日(火)18:00-19:00

場所:附属病院4階 第1会議室

テーマ「がんと栄養-ESPENのガイドラインより」

NST(麻酔科)より

お問合せは・・・
がんフロ
川上(内線2623)
経営企画
水野(内線2807)


第37回キヤンサーボード報告 ネオアジュバンドケモテラピーについて センター病院乳腺外科より

乳がんの進展

局所

全身


いつ?



局所疾患とは・・・

浸潤径1cm以下
リンパ管、血管の浸潤なし
悪性度が低い
ホルモン感受性あり
HER2陰性

pCR = 治癒




術前化学療法は、
治療の進歩に寄
与する

乳がんはひとつの病気ではない

画一的な治療では、効率が悪い
黒人の乳がんは予後が悪い
日本人の乳がんは予後が良い・・・
遺伝子発現解析がその原因を明らかにした
少なくとも4つのサブタイプに分かれる
4つのサブタイプの予後は明らかに異なる！
人種によってサブタイプの割合が違う

サブタイプ別の術前化学療法 (FEC₁₀₀-Doc₇₅)のpCR率




感受性が全く異なる！

バイオマーカーが必須である

予後予測因子

効果予測因子



乳がんには、アントラサイクリンとタキサンがある
アントラサイクリンにタキサンを上乗せするという使い方だった。
アントラサイクリンを使わない治療法が確立された！
アントラサイクリンの標的遺伝子TopII αの遺伝子座は、HER2の近傍にある
アントラサイクリンは、HER2陽性乳がんにより効果的である

症例を選んで、治療へ

HER 2+ Operable Breast Cancer

