

## 横浜市金沢区 CKD 診療連携用 診療情報提供書

&lt;紹介先&gt;

医療機関名： \_\_\_\_\_

診療科： 腎臓・高血圧内科 \_\_\_\_\_

&lt;紹介元&gt;

(ハンコ)

[患者情報]

|                     |  |
|---------------------|--|
| フリガナ<br>患者氏名： _____ | 生年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日 ( _____ 歳) |
| 性別： 男 ・ 女           |  |

[CKDステージ] (下表の該当箇所にチェックをお願いします)

## 紹介基準

| 原疾患                                     |                                | 蛋白尿区分          |       | A1                         | A2                          | A3            |
|---|--------------------------------|----------------|-------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 糖尿病性腎臓病                                 | 尿アルブミン定量 (mg/日)                |                |       | 正常                         | 微量アルブミン尿                    | 顕性アルブミン尿      |
|   | 尿アルブミン/Cr比 (mg/gCr)            |                |       | 30未満                       | 30～299                      | 300以上         |
| 高血圧性腎硬化症                                | 尿蛋白定量 (g/日)<br>尿蛋白/Cr比 (g/gCr) |                |       | 正常<br>(-)                  | 軽度尿蛋白<br>(±)                | 高度尿蛋白<br>(+～) |
| 腎炎                                      |                                |                |       | 0.15未満                     | 0.15～0.49                   | 0.50以上        |
| 多発性嚢胞腎                                  |                                |                |       |                            |                             |               |
| その他                                     |                                |                |       |                            |                             |               |
| GFR区分<br>(mL/分<br>/1.73m <sup>2</sup> ) | G1                             | 正常または<br>高値    | ≥90   |                            | ☐ 血尿+なら紹介、尿蛋白のみならば生活指導・診療継続 | ☐ 紹介          |
|   | G2                             | 正常または<br>軽度低下  | 60～89 |                            | ☐ 血尿+なら紹介、尿蛋白のみならば生活指導・診療継続 | ☐ 紹介          |
|   | G3a                            | 軽度～<br>中等度低下   | 45～59 | ☐ 40歳未満は紹介、40歳以上は生活指導・診療継続 | ☐ 紹介                        | ☐ 紹介          |
|   | G3b                            | 中等度～<br>高度低下   | 30～44 | ☐ 紹介                       | ☐ 紹介                        | ☐ 紹介          |
|   | G4                             | 高度低下           | 15～29 | ☐ 紹介                       | ☐ 紹介                        | ☐ 紹介          |
|   | G5                             | 高度低下～<br>末期腎不全 | <15   | ☐ 紹介                       | ☐ 紹介                        | ☐ 紹介          |

(作成：日本腎臓学会、監修：日本医師会)

出典：日本腎臓学会編、エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023;P18, 2023

横浜市大附属病院送付用

横浜市大附属病院 医学・病院企画課

FAX：045-787-2931

横浜市金沢区CKD診療連携用  
症例報告書

〈紹介先〉

医療機関名： 市大附属・南共済

その他 ( )

[患者情報]

性別： 男 ・ 女

〈紹介元〉

(ハンコ)

年齢： 歳

[CKDステージ] (下表の該当箇所にチェックをお願いします)

## 紹介基準

| 原疾患                                     | 蛋白尿区分                  |                | A1        | A2   | A3                          |
|---|------------------------|----------------|-----------|--|-----------------------------|
| 糖尿病性腎臓病                                 | 尿アルブミン定量<br>(mg/日)     |                | 正常        | 微量アルブミン尿   | 顕性アルブミン尿                    |
|   | 尿アルブミン/Cr比<br>(mg/gCr) |                | 30未満      | 30～299   | 300以上                       |
| 高血圧性腎硬化症                                | 尿蛋白定量(g/日)             |                | 正常<br>(-) | 軽度尿蛋白<br>(±)                                       | 高度尿蛋白<br>(+～)               |
| 腎炎                                      |                        | 尿蛋白/Cr比(g/gCr) | 0.15未満    | 0.15～0.49  | 0.50以上                      |
| 多発性嚢胞腎                                  |                        |                |           |  |                             |
| その他                                     |                        |                |           |  |                             |
| GFR区分<br>(mL/分<br>/1.73m <sup>2</sup> ) | G1                     | 正常または<br>高値    | ≥90       | <input type="checkbox"/> 血尿+なら紹介、尿蛋白のみならば生活指導・診療継続 | <input type="checkbox"/> 紹介 |
|   | G2                     | 正常または<br>軽度低下  | 60～89     | <input type="checkbox"/> 血尿+なら紹介、尿蛋白のみならば生活指導・診療継続 | <input type="checkbox"/> 紹介 |
|   | G3a                    | 軽度～<br>中等度低下   | 45～59     | <input type="checkbox"/> 40歳未満は紹介、40歳以上は生活指導・診療継続  | <input type="checkbox"/> 紹介 |
|   | G3b                    | 中等度～<br>高度低下   | 30～44     | <input type="checkbox"/> 紹介                        | <input type="checkbox"/> 紹介 |
|   | G4                     | 高度低下           | 15～29     | <input type="checkbox"/> 紹介                        | <input type="checkbox"/> 紹介 |
|   | G5                     | 高度低下～<br>末期腎不全 | <15       | <input type="checkbox"/> 紹介                        | <input type="checkbox"/> 紹介 |

(作成：日本腎臓学会、監修：日本医師会)

出典：日本腎臓学会編、エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023;P18, 2023

[備考] (要望したいこと)

事務連絡欄(附属病院のみ)：地域連携課に来たら医学・病院企画課へ