

カドサイラ療法

投与スケジュール

スケジュールは
変更になることがあります

外観	お薬名	点滴時間	薬の効果	スケジュール(日)	
				1	2-21
	吐き気止め アレルギー止め	10分	吐き気 アレルギー予防	●	お休み
	カドサイラ 成分名：トラスツズマブ エムタンシン	初回 90分 2回目～ 30分	がん細胞の 増殖を抑えます	●	



アレルギー様症状について


- 投与時にアレルギー様症状（イソフェジオソ・リアクショ）が起こることがあります。
主な症状として、発熱感・悪心・頭痛・寒気・血圧低下などがあります。
- 初回投与時に強くでることがありますが、2回目以降は軽くなる傾向があります。
- 症状がでた場合、点滴速度をゆっくりにするか一時中断することがあります。



投与日の注意 以下の場合はスタッフまでお知らせ下さい

- 点滴開始後に息苦しさ、顔のほてり、吐き気・気分不快などの症状があらわれた場合は我慢せずに医療スタッフまで申し出てください。
- 点滴部位に強い痛みや腫れ、かゆみを感じた場合は早めに医療スタッフまでお知らせください。

起こりやすい副作用の発現時期と対処



食欲不振・吐き気

- 抗がん剤を投与した日から1週間後ごろまで、食欲が落ちたり、吐き気の症状が見られることがあります。
- 無理せずに、食べやすいものを食べられる量から摂るようにしましょう。
- 吐き気止めが処方されている場合は、指示通り内服してください。

血小板減少

血小板：出血をとめるために必要な成分

- 血小板が減少してあざや、出血が起こりやすくなることがあります。
- 点滴した日から1週間後ごろに血小板が最も少なくなります。
- けがや打撲に注意し、歯磨きや鼻かみはやさしく行いましょう。

出血傾向

- 鼻や歯肉などの粘膜から軽度の出血が起こることがあります。出血は通常軽く、自然にまたは圧迫することで止まります。
- 抜歯などの、出血を伴う歯科治療を行う場合は、事前にお知らせください。
- 10～15分たっても血が止まらない場合は、病院までご連絡ください。

下痢

- 投与後約3～4日ごろから、下痢や水っぽい便が出ることがあります。
- 脱水予防のためスポーツドリンクなど塩分を含んだ飲料水で水分補給を行って下さい。
- 多くの場合、治療を続けていくうちに回数が少なくなってきます。
- 薬で症状を和らげることもできます。医師・看護師・薬剤師に相談して下さい。

しびれ

- 投与3～5回目ごろから、手首から指先・足首から足先にかけてしびれたり感覚が鈍くなることがあります。
- 抗がん剤投与回数が増すとしびれが強くなったり長く続く傾向があります。
- 箸が持ちにくい、ボタンがかけづらい、つまづきやすいなど日常生活に影響がある場合はご相談下さい。

疲労感

- 「だるい」・「からだが重い」・「疲れやすい」と感じることがあります。
- 疲れたなと思ったときは、無理せず、ちょっと横になるなど、休息をこまめにとるとよいでしょう。

心臓への影響

- まれに心臓がドキドキしたり、息苦しくなったり、からだがむくむことがあります。
- こんな症状があらわれたら、連絡してください。
 - ✓ 平らな道を歩いただけでも、心臓がドキドキする。
 - ✓ あおむけでは息が苦しい
(上半身を起こした姿勢にすると楽になる)



自宅でこのような症状が現れたら、必ずご連絡下さい

- 38度以上の発熱があるとき
- 乾いた咳が続く、または息切れを感じる時
- 1日の半分以上を寝てすごすほどのだるさがあるとき
- 吐き気止めの薬を内服していても、1日6回以上の嘔吐、または水分をとれないほどの吐き気があるとき
- 1日7回以上の下痢があるとき
- 点滴した部位が赤く腫れてきた、痛みや熱感がある
- 皮膚に発疹やじんましんが出てきた



病院へ電話する前に確認しましょう

- ① 診察券番号
- ② おかかりの診療科
- ③ 主治医の名前
- ④ 抗がん剤治療中であること
- ⑤ 気になる症状（具体的に）

連絡先



横浜市立大学附属病院

《平日8:30～17:00》

おかかりの診療科外来を
伝えてください

《平日の夜間および休日》

救急外来と伝えてください

TEL:045-787-2800（代表）

※ここに診察券の内容を写しましょう

診察券番号： _____

お名前： _____