

ティーエスワン(TS-1)+ハーセプチソーラー(3週ごと)

治療のスケジュール

症状や経過に合わせて
お休み期間は変わります。

お薬名	1日目	2~14日目	15~21日目
ハーセプチソーラー	○	お休み	
エスワン (飲み薬)	1日2回 朝・夕食後 30分以内 点滴日の夕食後～15日目の朝食後 まで2週間服用、1週間お休み これ以降は、お薬が残っていても 飲まないでください。残ったお薬は、 受診時に持ってきてください	お休み	

点滴スケジュール

外観	お薬名	点滴時間	お薬の効果
	ハーセプチソーラー	初回90分 2回目から 30分	がん細胞の増殖を抑える 薬です。



S-1を飲むときの注意点

□ あなたの飲む薬



●飲み忘れたとき

飲み忘れの分をとばして(服用せず)
次の分から飲んでください。
絶対に2回分を一度に飲んではいけません。

●まちがって一度に多く飲んでしまったとき

すぐに病院へ連絡してください。

□ あなたの飲む薬





点滴中の注意

以下の症状が見られたら我慢せずに医療スタッフに声をかけてください

- 点滴部位の強い痛みや腫れ、かゆみ（血管痛・点滴の血管外への漏れ）
- 動悸、息切れ、発疹、冷汗（アレルギー症状）

起こりやすい副作用の発現時期と対処

アレルギー

食欲低下
・倦怠感

白血球減少・発熱

口内炎・下痢

皮膚や爪の変化

投与当日

1週間後

2週間後

食欲不振・吐き気・おう吐

- 抗がん剤内服中に食欲が落ちたり、吐き気やおう吐といった症状が見られることがあります。
- 無理せずに、食べやすいものを少しづつ食べるようしましょう。

下痢

- 消化の良いものを少しづつ食べ、水分を多くとってください。

口内炎

- 口腔内が痛んだり、食べ物がしみることがあります。また、炎症がひどくなると潰瘍ができてしまいます。
- 口の中を清潔に保つため、うがいをこまめにおこなってください。
- 食後は柔らかい歯ブラシでやさしく歯磨きをしてください。

白血球・赤血球・血小板の減少

- 投与後1～2週間ごろに最も白血球が減少します。
- 白血球が減少すると体の抵抗力が弱くなり感染症にかかりやすくなります。予防のため外出の際は人ごみを避け、こまめにうがい手洗いをしましょう。
- 赤血球が減少すると、疲れやすさ、息切れ、動悸がするなどの貧血症状が現れことがあります
- 出血を止める作用のある血小板が減少すると、内出血、鼻血、口の中の出血が見られることがあります。

皮膚や爪の変化

- 投与数週間後から手のひらや足の裏に刺すような痛み、手足の感覚麻痺、腫れ、皮膚の赤みや乾燥、かゆみ、水疱のような症状が現れることがあります。
- 刺激の少ない石鹼などで皮膚や爪を清潔に保ち、クリームやローションなどで保湿しましょう。
- 手足の皮膚や爪などに黒ずみ（色素沈着）が起こることがあります。
- 直射日光を避け、日焼け止めクリームなどで対処しましょう。

心臓への影響

- まれに心臓がドキドキしたり、息苦しくなったり、からだがむくむことがあります。
- こんな症状があらわれたら、連絡してください。
 - ✓ 平らな道を歩いただけでも、心臓がドキドキする。
 - ✓ あおむけでは息が苦しい
(上半身を起こした姿勢にすると楽になる)



重要

このような症状が現れたら、必ずご連絡ください

- 38度以上の発熱があるとき
- 1日の半分以上を寝てすごすほどのだるさがあるとき
- 乾いた咳が続く、または息切れを感じるとき
- 吐き気止めの薬を内服していても、1日6回以上の嘔吐、または水分をとれないほどの吐き気があるとき
- 1日7回以上の下痢があるとき
- 点滴した部位が赤く腫れてきた、痛みや熱感がある
- 皮膚に発疹やじんましんが出てきた



病院へ電話する前に確認しましょう

- ①診察券番号
- ②かかりの診療科
- ③主治医の名前
- ④抗がん剤治療中であること
- ⑤気になる症状（具体的に）

連絡先

横浜市立大学附属病院

電話：045（787）2800（代表）

《平日8:30～17:00》

かかりの診療科外来を
伝えてください

《平日の夜間および休日》

救急外来と伝えてください

※ここに診察券の内容を写しましょう

			-				-	
--	--	--	---	--	--	--	---	--

お名前

